

# DIAGNOSTICUL TB PULMONARE STABILIT POST-MORTEM ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

**POPA VASILE,** IMSP SCMF vice director  
**Ustian Aurelia,** Conf.univer, DR.șt. Med. |

# Actualitatea temei

Tuberculoza rămîne una din cauzele principale a mortalității în țările cu venit mic și mijlociu

Diagnosticul de TB stabilit post-mortem variază în diferite țări între 2,0 și 6,0% printre cazurile noi

Mortalitatea prin TB este în discreștere cu aproximativ 50% față de a.1990

În Republica Moldova mortalitatea prin TB a scăzut în a.2015 pînă la 10‰, iar în municipiul Chișinău constituie 6,8‰

OMS pentru a.a. 2016-2035 recomandă o reducere a mortalității cu 90% comparativ cu a. 2015

Programul Național de Control al Tuberculozei pentru a.a.2016-2020 prevede o scădere a mortalității cu 35%

# Scopul studiului

Evaluarea dinamicii stabilirii diagnosticului de TB post-mortem în municipiul Chișinău în trei perioade diferite în dependență de indicele mortalității

# Materiale și metode

Au fost studiate datele statistice privind diagnosticul TB stabilit post-mortem în trei perioade de timp:

- 2001-2003

Implementarea strategiei DOTS în RM


- 2007-2009

Creșterea esențială a mortalității în RM

- 2013-2015

Descreșterea evidentă a mortalității prin tuberculoză în RM

# Cazurile deceselor TB în municipiul Chișinău



■ decedați TB

■ depistați  
p/mortem

494

99


456

63

225

29

# Ponderea TB post-mortem din cazurile noi




% post-mortem

4.3


3

1.9

# Cazurile TB post-mortem după gen



# Cazurile TB post-mortem conform vârstei



■ 2001-2003

8

14

26

42

9

■ 2007-2009

2

12

19

19

11

■ 2013-2015

5

5

5

5


9



# Cazurile Tb post-mortem după locul survenirii decesului

Anii	Domiciliu		Staționar somatic		Alt loc		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
2001-2003	50	50,5	23	23,2	26	26,3	99	100
2007-2009	28	44,4	9	14,3	26	41,3	63	100
2013-2015	15	51,7	9	31,0	5	17,3	29	100

# Cazurile Tb post-mortem conform locului de trai



■ FLT	44	26	9
■ LTS	55	37	20

# Concluzii

Rata deceselor cu diagnosticul TB stabilit post-mortem este în descreștere. Raportul B/F este de 6:1

Se atestă o majorare a diagnosticului TB post-mortem la vârsta de 41-50 și > 60 ani primele două perioade și o micșorare între vîrstele 41-60 ani în perioada a treia

Rămîne stabilă rata decesului survenit la domiciliu, se majorează în staționarele somatice și scade în alt loc.

Numărul deceselor la persoanele fără loc stabil de trai s-a micșorat.

Numărul deceselor cu diagnosticul TB post-mortem printre cazurile noi scade.

# Recomandări

- Perfecționarea metodelor de confirmare a TB post-mortem prin includerea investigațiilor histologice, microbiologice și molecular-genetice, care vor îmbunătăți și calitatea serviciului medico-legal
- Stabilirea locului tuberculozei în cauza morții din certificatul medical constatator al decesului:
- Verificarea morfologică a cazurilor de către morfopatologul specializat
- Sporirea vigilineței medicinei primare și spitalelor somatice pentru depistarea Tb intravital



**MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!**